

农作物病虫害情报

第六期

(2021年5月26日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

早稻破口期病虫害防治意见

据我中心5月19、21、24、25、26日到苍城、塘口、赤水、金鸡、蚬冈和月山等镇调查发现,我市部分稻田干旱缺水,个别早插植稻田已开始破口扬花,预计6月上旬全面进入破口期。当前我市早稻的主要病虫害是稻瘟病、稻飞虱、蓟马,主要为害历史稻瘟病区及封行期未施药田块,总体属中等偏轻发生。

一、稻瘟病,属中等发生。个别镇及历史病区稻田已发病,应施药防控的调查点如下:塘口镇魁草村、赤水镇和安村、金鸡镇游东村、金鸡镇大同村、蚬冈镇春山村、蚬冈镇南联村、蚬冈镇蚬北村。

二、纹枯病,属偏轻发生,个别稻田中等发生。调查点病丛率如下:塘口镇南屏村、塘口镇魁草村、苍城镇楼田村、赤水镇羊路村、赤水镇和安村、金鸡镇向北村、金鸡镇游东村、金鸡镇大同村、蚬冈镇春山村、蚬冈镇南联村 $<5\%$,蚬冈镇蚬北村 $<30\%$ (应施药防控)。

三、稻飞虱,属偏轻发生。调查点百丛虫量如下:塘口镇南屏村、塘口镇魁草村、苍城镇楼田村、赤水镇羊路村、蚬冈镇春山村、月山镇石头村 <100 头,金鸡镇大同村、蚬冈镇蚬北村200头,蚬冈镇南

联村、金鸡镇向北村 300 头，赤水镇和安村 600 头（应施药防控）。

四、蓟马，属局部中等发生。应施药防控的调查点百丛虫量如下：金鸡镇大同村、蚬冈镇蚬北村、月山镇石头村 1000 头，蚬冈镇南联村 1500 头，金鸡镇向北村、金鸡镇游东村 3000 头。

五、稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫及稻苞虫，属零星发生。

六、防治意见

稻瘟病发病田块及历史病区应及时施药，做好破口期及齐穗期防控工作。另因封行期病虫害发生较轻，部分田块未进行施药防治，导致蓟马、稻飞虱、纹枯病等个别病虫害达到防治指标。各镇（街）在做好农作物抗旱工作的同时，应发动群众田间病虫害调查，对达到防治指标田块立即施药防控，为水稻扬花授粉创造有利条件，确保粮食丰收。

推荐药剂及亩用量如下：

1. 防治稻瘟病，使用 75%三环唑可湿性粉剂 30 克、或 40%稻瘟灵 80 毫升。

2. 防治纹枯病，使用 19%啶氧·丙环唑 67 毫升、或 32.5%嘧菌酯·苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑·丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋·己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克。

3. 防治稻飞虱、蓟马，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克。

4. 防治钻蛀性螟虫、稻苞虫及稻纵卷叶螟，使用 10%四氯虫酰胺 20 克、或 6%乙基多杀菌素 30 毫升、或 15%茚虫威 12 毫升、或 20%氯虫苯甲酰胺 10 克、或 5%甲维盐 100 毫升、或 1.8%阿维菌素 100 毫升。

以上药剂兑水 70 公斤均匀喷施，药后 6 小时内遇中雨以上要及时补施。

注意事项：请自觉回收农药包装废弃物，保护农业农村生态环境。