

农作物病虫害情报

第九期

(2022年6月20日发布)

开平市农业综合服务中心

Tel: 2303539

地址: 开平市长沙良园路60号

Email: kpsnyzhfwzx@jiangmen.gov.cn

早稻后期主要病虫害防治意见

据省气象部门预测,6月下旬我省仍有两次大范围降水过程,有持续性暴雨且呈加强趋势,强降水时间超长,累积雨量大。当前我市早稻大部分处于灌浆期,田间郁闭度高,通风透光性差,利于后期纹枯病、稻飞虱的发生为害。受前期降雨多影响,部分田块漏治或防治效果差,后期局部地区水稻病虫害潜在暴发风险。

当前我市早稻的主要病虫害是纹枯病、稻飞虱,总体属偏轻、局部偏重发生。但雷雨大风天气容易造成稻秆稻叶损伤,甚至造成倒伏,有利于病虫害的暴发流行。

各镇(街)应加强稻田管理,及时排干积水,促进根系生长,壮秆健株,提高抗病虫能力。重点加强雨天施药及低洼田块的病虫害调查,纹枯病丛发病率达15%、稻飞虱百丛虫量达1000头的田块,应立即施药防治。

推荐药剂及亩用量如下:

1.防治纹枯病,使用19%啶氧·丙环唑67毫升、或32.5%噻菌酯·

苯醚甲环唑 30 毫升、或 30%苯醚甲环唑·丙环唑 15 毫升、或 50%噻呋·己唑醇 10 克、或 20%井冈霉素 50 克。

2.防治稻飞虱，使用 10%三氟苯嘧啶 10 毫升、或 25%噻嗪酮 40 克、或 25%噻虫嗪 4 克、或 25%烯啶虫胺 20 克、或 25%吡蚜酮 20 克。

以上药剂兑水 70 公斤常规喷雾，药后 6 小时内遇中雨以上要及时补施。

如遇重大作物疫情，及时上报市农业综合服务中心。